

Como utilizar o Kenocox?



Retire todos os equipamentos removíveis

- Retirar do pavilhão todo o material removível (comedouros, baldes etc ...), limpar e desinfetar todo o material de acordo com o protocolo descrito abaixo.



Limpeza a seco

- Remover todos os resíduos de estrume, cama e ração
- Vantagens: facilita a limpeza posterior, reduzindo o tempo e aumentando a eficiência da limpeza húmida (limpeza principal)



Aplicação de detergente

- 1,5 % **Keno^{san}** em espuma
- Todas as superfícies: paredes, piso, teto, bebedouros e linhas de alimentação ...
- Tempo de contato: 30 minutos



Limpeza principal

- Limpe com alta pressão: limpeza mecânica (50-150 bar e 12-30 litros / minuto)
- Todas as superfícies: paredes, piso, teto, bebedouros e linhas de alimentação, ...
- Água quente se disponível (40 °C): limpeza mais rápida e fácil



Enxaguamento

- Enxague o aviário com água fria (alta pressão e elevado fluxo) para remover as partículas de sujidade e o detergente



Remova o excesso de água e deixe secar

- Remova todo o excesso de água do aviário e deixe secar
- É importante que o pavilhão esteja seco antes de iniciar a desinfecção para evitar diluição do produto

Desinfecção antiparasitária

- Kenocox** em spray ou espuma, % com base no diagnóstico *
- Tempo de contato: mínimo 2 horas
- Deixe secar

* ler o rótulo antes de utilizar

WE
MAKE
HYGIENE
WORK

Higiene é saúde. A higiene faz toda a diferença na cadeia alimentar, do campo ao garfo. Combinamos soluções de 360° com aconselhamento personalizado. Procuramos um serviço de elevado nível e investimos em inovação contínua. Dessa forma, ajudamos nossos parceiros a focarem-se no que é fundamental: manter seus negócios lucrativos, sustentáveis e, acima de tudo, saudáveis. Porque higiene é saúde e saúde significa maior bem-estar para todos.

ZOOPAN
SAÚDE E NUTRIÇÃO ANIMAL
CID LINES

Waterpoortstraat 2, 8900 Ieper • Belgium • T +32 57 21 78 77 • F +32 57 21 78 79 • info@cidlines.com • www.cidlines.com



KenocoxTM

O ELO EM FALTA NO CONTROLO DA COCCIDIOSE!

- Muito eficaz mesmo nas formas mais resistentes dos oocistos: oocistos esporulados
- Formulação única, sem fenol; patenteado

ZOOPAN
SAÚDE E NUTRIÇÃO ANIMAL

CID LINES

O elo em falta no controlo da coccidiose


A coccidiose em aves é uma infecção **causada** por parasitas unicelulares (protozoários) pertencentes à família *Eimeria*. Estes parasitas podem disseminar-se rapidamente na sua exploração, sendo muito difíceis de erradicar. O ciclo de vida, com todos os estágios de desenvolvimento associados, ocorre tanto dentro do animal hospedeiro (endógeno) quanto no ambiente exterior (exógeno: oocistos).

Fase endógena

As coccídias têm como alvo os intestinos das aves, onde se multiplicam nas células hospedeiras e causam lesões graves

Fase exógena

- Disseminação no meio ambiente: excreção dos oocistos juntamente com as fezes dos animais
- Desenvolvimento dos oocistos para formar um oocisto esporulado: isso leva cerca de 1 a 2 dias em condições ideais (como as verificadas num aviário)
- Contaminação oral: injeção de oocistos esporulados infectantes



O meio ambiente é a principal fonte de infecção. Aves infectadas com um oocisto esporulado podem excretar milhares de oocistos nas suas fezes. Os oocistos são altamente resistentes às condições externas.

A doença pode ter um elevado impacto económico na sua exploração:

Coccidiose subclínica:

↓ Taxa de conversão alimentar
↓ Ganho de peso diário
↓ Produção de ovos
podem ser factores de predisposição para outras doenças.

Coccidiose clínica:

Aves visivelmente doentes
Diarreia severa
Elevada mortalidade

O principal objetivo da limpeza e desinfecção é interromper a transmissão fecal-oral dos microrganismos e manter uma baixa pressão de infecção, uma vez que elimina os parasitas presentes no meio ambiente (durante a fase exógena). Estão disponíveis diversos medicamentos para a prevenção e o tratamento da coccidiose, mas estes produtos actuam apenas nas fases endógenas do ciclo de vida do parasita. Procedimentos de limpeza e desinfecção eficazes são por isso uma ferramenta muito importante para ajudar a combater a coccidiose na sua exploração.

O que é o **KenoTMcox**?

Os oocistos são um dos patógenos mais difíceis de matar e muitos desinfetantes não são eficazes. Adicionalmente, os desinfetantes puros actuam apenas sobre a forma não esporulada, apesar de a forma esporulada ser a mais crítica!

KenoTMcox é um desinfetante de largo espectro com eficácia comprovada contra bactérias, vírus e protozoários no meio ambiente (como por exemplo a *Eimeria spp.*).

Desinfecção nos aviários com **KenoTMcox**

- é essencial para reduzir a pressão de infecção
- faz certamente parte de um programa coccidiocida adequado!
- pode ser aplicado em todos os tipos de superfície
- é seguro para o utilizador e para os animais, devido à sua fórmula única, sem fenol.

Procedimentos adicionais, como a limpeza adequada dos pavilhões com um detergente alcalino espumante como **KenoTMsan** e a manutenção das aves secas durante as primeiras semanas contribuem para a redução do número de oocistos na sua exploração.

Espuma eficaz

Para garantir a eficácia o desinfetante tem de manter o contacto com as superfícies durante todo o tempo recomendado! **KenoTMcox** tem uma formulação única que permite que a espuma adira fortemente e aumente o tempo de contacto com a superfície. Desta forma, elimina os patógenos mais resistentes.



Microorganismos		Diluição e tempo de contacto			
Parasitas	<i>Eimeria spp.</i>	4%	2h		
Vírus		1%	30 min		
Bactérias		0,25%	30 min		
Fungos		0,25%	30 min		



Recomenda-se a aplicação do KenoTMcox durante o vazio sanitário