



Autorização de Venda n.º 1189, concedida pela DGAV.
ESTE PRODUTO DESTINA-SE AO USO NÃO PROFISSIONAL –
linha jardins e hortas familiares e linha plantas de interior.

Descrição

BROMORY é um produto de ação total não seletivo das culturas que age estritamente por contacto. provoca alterações na permeabilidade da membrana celular da epiderme das plantas. *BROMORY* tem uma ação rápida em poucas horas.

Formulação

Concentrado para emulsão (EC) contendo 500 g/L ou 51,92% (p/p) de ácido pelargónico.

Modo de acção

O ácido pelargónico está presente naturalmente na Natureza, com um modo de acção único. Actua por contacto dissecando as infestantes. Provoca alterações na permeabilidade da membrana celular da epiderme das plantas, destruindo a cutícula e provocando a desidratação em poucas horas. É um dos poucos herbicidas de origem natural, extraído do girassol. Após a aplicação, as infestantes secam naturalmente, com efeitos visíveis duas horas depois.

Utilização, doses, épocas e condições de aplicação

Viveiros de ornamentais:

Controlo das infestantes monocotiledóneas e dicotiledóneas

Dose: 22,5mL/10m² | Volume da calda: 300-750mL/10m².
Aplicar nos primeiros estados de desenvolvimento das infestantes. Deve assegurar uma boa cobertura do alvo

biológico. Efectuar o tratamento preferencialmente com o céu limpo. Não aplicar na presença de orvalho. São permitidas no máximo de 4 aplicações espaçadas de 14 a 28 dias.

Controlo do musgo

Dose: 18mL/10m² | Volume da calda: 300-750mL/10m².
Aplicar nos primeiros estados de desenvolvimento do musgo. Deve assegurar uma boa cobertura do alvo biológico. Efectuar o tratamento preferencialmente com o céu limpo. Não aplicar na presença de orvalho. São permitidas até ao máximo de duas aplicações.

Zonas urbanas e de lazer e vias de comunicação (aplicação em ambiente doméstico, hortas familiares, jardins familiares e plantas de interior):

Controlo das infestantes monocotiledóneas e dicotiledóneas

Dose: 22,5mL/10m² | Volume da calda: 300-750mL/10m².
Aplicar nos primeiros estados de desenvolvimento das infestantes. Deve assegurar uma boa cobertura do alvo biológico. Efectuar o tratamento preferencialmente com o céu limpo. Não aplicar na presença de orvalho. São permitidas o máximo de quatro aplicações espaçadas de 14 a 28 dias.

Controlo do musgo

Dose: 18mL/10m² | Volume da calda: 300-750mL/10m².
Aplicar nos primeiros estados de desenvolvimento do musgo. Deve assegurar uma boa cobertura do alvo biológico. Efectuar o tratamento preferencialmente com o céu limpo. Não aplicar na presença de orvalho. São permitidas até ao máximo de duas aplicações, uma na Primavera e outra no Outono.

Condições de utilização e restrições, respeitantes a todas as finalidades

Armazenar a uma temperatura superior a 8°C.

Precauções biológicas

Evite qualquer contato com as folhas das plantas cultivadas.

Modo de preparação da calda

Na preparação da calda deitar metade do volume de água adequado para a pulverização prevista. Deitar a quantidade de produto necessária e completar o volume de água pretendido, assegurando agitação contínua.

Modo de aplicação

Calibrar adequadamente o equipamento, calculando o volume de calda gasto por hectare, de acordo com o débito do pulverizador (L/min), da velocidade e largura de trabalho, com especial cuidado na uniformidade da distribuição da calda. A quantidade de produto e o volume de calda devem ser adequados à área de aplicação, respeitando as doses indicadas. Para diminuir o risco de arrastamento, evitar pressões superiores a 2 kg/cm² e/ou usar bicos anti-arrastamento.

Limpeza do pulverizador

Após cada tratamento com *Bromory* lavar cuidadosamente o pulverizador com água e um agente molhante (recomendado para a lavagem de pulverizadores), em conformidade com a legislação em vigor.

Infestantes monocotiledóneas e dicotiledóneas

Infestantes susceptíveis

Beldro (*Amaranthus hybridus*), bredos (*Amaranthus retroflexus*), catassol (*Chenopodium album*), *Geranium pusillum*, cardo-morto (*Senecio vulgaris*), milhã-digitada (*Digitaria sanguinalis*), cabelo-de-cão (*Poa annua*), poa-comum (*Poa trivialis*), milhã-verde (*Setaria viridis*).

Infestantes moderadamente susceptíveis

Repimpim (*Erodium cicutarium*), gerânio-peludo (*Geranium rotundifolium*), beldroega (*Portulaca oleracea*), bromos (*Bromus mollis*), azevão (*Lolium multiflorum*), verónica-da-pérsia (*Veronica persica*), milhã-amarelada (*Setaria pumila*).

Embalagens disponíveis

100 ml, 250 ml e 1L.

Um produto

