



Boskbio Activ Tricho



Descrição

Produto fertilizante UE CFP 6(A) – Bioestimulante microbiano para plantas.

Produto destinado à produção agrícola.

Ingredientes

CMC7 – Fungos micorrízicos (*Trichoderma*). Concentração: 1×10^7 UFC/g.

CMC7 – Fungos micorrízicos (*Glomus spp.*). Concentração: 4% (p/p)

CMC7 – Rizobactérias. Concentração: 1×10^3 UFC/g.

Contém 8,0% de matéria orgânica.

Características

- Boskbio Activ Tricho contém fungos micorrízicos com características adaptáveis a diferentes tipos e condições de solo. Colonizam o solo rapidamente, impedindo os fungos patogénicos de se nutrirem, o que inibe a sua germinação.
- A aplicação de Boskbio Activ Tricho permite melhorar a performance dos fertilizantes, melhora o enraizamento e o crescimento das plantas e tem uma acção de restrição e contenção sobre os organismos responsáveis pela podridão radicular, incluindo *Pythium spp*, *Rhizoctonia spp*, *Verticillium spp*, *Phitophthora capsici*, entre outros.

Usos e método de aplicação

- Pode ser utilizado no tratamento de sementes, estacas ou tubérculos.
- Pode ser misturado com os substratos de crescimento, usado em viveiros de plantas e para envasamento.

- Pode ser colocado no fundo dos sulcos ou buracos cavados para plantação ou reposição de plantas (plantas ornamentais, etc).

- No campo ou em estufa pode ser aplicado por pulverização, fertirrigação ou injeção. Utilizar bicos de aplicação de diâmetro igual ou superior a 0,9 mm.

Culturas e doses de aplicação

Culturas hortícolas, flores, plantas ornamentais e viveiros

Solo (pré-sementeira ou pré transplante):

Em estufa: 300-500 g/1000 m² (0,3- 0,5 g/m²)

Em campo aberto: 3-5 kg/ha (0,3- 0,5 g/m²)

Envasamento: 0,3 a 1 g/L de substrato.

Árvores de fruto

Pomares novos:

Plantação e replantação: 10 g/planta

Recomeço vegetativo: 5 kg/ha, por fertirrigação

Pomares em produção:

Recomeço vegetativo: 5 kg/ha, por fertirrigação

Recuperação:

Plantação e replantação: 20 g/planta

Recomeço vegetativo: 20 g/planta

Tratamento de árvores de fruto grandes e médias:

Recomeço vegetativo: 5 g/injecção

(aproximadamente a cada 2 m²).

Relvados

Relvados instalados:

Para os melhores resultados, aplicar 5Kg/ha, preferentemente no início da época de crescimento, e repetir mensalmente a 3Kh/ha.

Instalação de novos relvados:

Aplicar 5Kg/ha antes da sementeira ou plantação do relvado.

Tratamento de sementes

Cereais de primavera e de inverno (trigo mole, trigo duro, cevada, centeio, tritcale, aveia, etc):

Aplicação na semente.

Dose: 500 g por cada 100 kg de semente

Alfafa:

Aplicação na semente.

Dose: 500 g por cada 100 kg de semente

Indicações de diluição para tratamento de sementes:

Dissolver 5 g de Boskbio Activ Tricho para 1 kg de semente, utilizando um volume de água adequado para misturar a quantidade total de semente (o ideal é 1 l de água para 100 kg de semente). Misturar precisa e homogeneamente a solução com a semente.

Recomenda-se a realização de um ensaio de compatibilidade antes de aplicar o produto sob a forma de mistura.

Contactar o fornecedor para recomendações mais específicas.

Condições de armazenagem recomendadas

Manter o produto na sua embalagem original.

Armazenar em local fresco e seco, ao abrigo da luz solar directa.

Informação relativa à segurança e ao ambiente

Contém *Trichoderma*. Os microrganismos podem provocar reacções de sensibilidade.

Manter fora do alcance das crianças.

Não comer, beber ou fumar durante a utilização do produto.

Embalagens disponíveis

Saqueta de 1 kg.